UNIVERSITÄTS
KLINIKUM
HEIDELBERG

Psychotherapie bei Essstörungen im Erwachsenenalter

Prof. Dr. Hans-Christoph Friederich
Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik
Medizinische Universitätsklinik Heidelberg

Einführung

Welche
Gedanken
und Gefühle
löst dieses
Bild in
Ihnen aus?

Einführung

- Paradoxie und Widersprüche
 - Autonomieideal vs. Geborgenheitswünsche
 - „Splendid isolation“ vs. Selbstunsicherheit
 - Horten von Lebensmitteln vs. Hunger leiden
- Herausforderungen in der Behandlung
 - Bindung an Symptomatik
 - Subjektive Gratifikation
 - Fehlende Krankheitseinsicht, Krankheitsverleugnung
 - Vermeidungscharakter
- -> schwierig die Patientin für die Behandlung zu gewinnen

Übersicht

Spektrum der Ess-Störungen

Binge Eating Störung

Bulimia nervosa

Anorexia nervosa

Psychotherapie

ANOREXIA NERVOSA

Psychotherapie der Magersucht

Esstörungsspezifisches
Behandlungskonzept

Unspezifisches
Behandlungskonzept

Magersucht

FPT, CBT-E versus „treatment as usual“

10 Centres

Bochum
Erlangen
Essen
Freiburg
Hamburg
Heidelberg
München
Münster
Tübingen
Ulm

Centre directors

Prof. Herpertz
Prof. de Zwaan
Prof. Senf
Prof. Zeeck
Prof. Löwe
Prof. Herzog
Prof. Henningsen
Prof. Heuft
Prof. Zipfel
Prof. v. Wietersheim

Data management:

Coordination Centre for Clinical Studies
(KKS) Marburg

Biometry: Heidelberg

Magersucht

Behandlungsmanuale

CBT

- Symptomorientierter Fokus (z.B. Essprotokolle)
 - Module (obligatorische vs. optional)
 - Hausaufgaben
- Wiegen durch Therapeuten

FPT

- Fokus auf der Beziehung und dem Bindungsstil
 - Operationalisierte psychodynamische Diagnostik (OPD)
 - 3 Phasen
- Wiegen durch Studienassistentz

TAU-O

(„treatment as usual - enhanced“ ; ambulante Richtlinienpsychotherapie und strukturierter Hausarztkontakt)

Magersucht

Flow-chart

Magersucht

BMI-Verlauf

Magersucht

Global Outcome

Herzog et al. 2022

Magersucht

Inanspruchnahme zusätzlicher Therapie

Magersucht - Sekundäranalysen

Prädiktoren für Behandlungserfolg (BMI)

- Prädiktoren für negativen Outcome
 - Niedriger Ausgangs-BMI
 - Dauer der Erkrankung (> 6 Jahre)
 - Höheres Lebensalter zu Beginn der Therapie
 - Komorbide Depression bzw. niedriges Selbstwertgefühl
- Angststörungen, einschließlich Zwangserkrankungen, Essstörungspsychopathologie, Subtyp der Magersucht zeigten keinen Einfluss auf den Behandlungserfolg (Wild et al. 2016)
- Soziale Faktoren (Familie, Partnerschaft, Bildung, berufliche Situation) zeigten ebenfalls keinen Einfluss (Teufel et al. 2017)

Magersucht - Sekundäranalysen Therapieprozessforschung

- Computerized text analysis -

Extraction and analyses of word categories
e.g.. emotional words

Friederich et al. 2017

Magersucht - Sekundäranalysen

Therapieprozessforschung

	BMI at the end of therapy				BMI at 1-year FU			
	B	SE B	β	p	B	SE B	β	p
% negative words in the middle phase of therapy	1.055	0.346	0.307	0.003	0.880	0.454	0.215	.057

Magersucht - Sekundäranalysen

Therapieprozessforschung, „therapeutischer Durchbruch“

Skalierung Y-Achse: Horizontale Hauptlinien (kompakt) entsprechen einem Inkrement von 1kg, horizontale Punktlinien entsprechen einem Inkrement von 0,25kg.

*hier Gewicht bei Therapiebeginn als ganze Zahl ohne Dezimalstelle eintragen.

Gewicht an den Hauptstrichen (1kg Inkrement) der Y-Achse entsprechend ergänzen.

Zusammenfassung

Magersucht - ANTOP trial

- Ambulante Psychotherapie zeigt anhaltende Veränderungen Patientinnen mit Magersucht
 - BMI-Anstieg und Rückgang der Essstörungssymptomatik während und im Anschluss an die Therapie (Beobachtungszeitraum über 5 Jahre!)
 - 41% der Patientinnen zeigen eine Remission, 41% eine Teilremission und 18% weiterhin das Vollbild der Erkrankung
 - Störungsspezifische Therapie vergleichbar zu üblicher Standardbehandlung (cave: Ergebnisse beeinflusst durch intensive Nachsorge, > 50% der Pat. haben weitere Therapien in Anspruch genommen)
- Prädiktoren für gutes Behandlungsergebnis
 - Hoher Ausgangs-BMI
 - Kurze Erkrankungsdauer (< 6 Jahre)
 - Fehlende depressive Komorbidität

Zusammenfassung

Magersucht - ANTOP trial

- Körperlich stabile Patientinnen mit einem BMI $\geq 15\text{kg/m}^2$ können sicher in einem ambulanten Therapiesetting behandelt werden (Krankenhaus Back-up notwendig!)
- Entwicklung neuer gezielter Behandlungsstrategien für Patientinnen, die auf die bisherige Behandlung nicht ansprechen
- Frühzeitige Vorhersage eines schweren Krankheitsverlaufs bisher nicht möglich
- Sekundäranalysen der ANTOP Studie unterstreichen
 - die gezielte Berücksichtigung depressiver Komorbidität in der Behandlung
 - die Relevanz des affektiv-emotionalen Erlebens in der mittleren Therapiephase
 - eine phasenspezifische (frühe, mittlere, späte) Therapie, mit unterschiedlichen therapeutischen Herausforderungen

Psychotherapie

BULIMIA NERVOSA

Bulimia nervosa: Meta-Analyse

Vergleich Prä-Post-Treatment

Kognitive Verhaltenstherapie

- Abstinenzrate Essanfälle: 51% (CI 0,44 – 0,58)
- Abstinenzrate Purging-Verhalten: 54% (CI 0,46 - 0,62)
- Remission (Keine Essstörungsdiagnose): 36% (CI 0,28 - 0,45)

Pharmakotherapie

- Abstinenzrate Essanfälle: 19% (CI 0,13 – 0,27)

Angeleitete Selbsthilfe

- Abstinenzrate Essanfälle: 42% (0,34 – 0,52)

Svaldi et al. 2019

Bulimia nervosa: Meta-Analyse

Katamnese

Svaldi et al. 2019

Bulimia nervosa: Meta-Analyse

- Prädiktoren für Behandlungserfolg
 - Kurze Erkrankungsdauer
 - Später Erkrankungsbeginn
 - höheres Lebensalter bei Behandlungsbeginn
 - Fehlen einer affektiven Komorbidität
- Inwieweit eine Kombinationstherapie (Psychotherapie plus Pharmakotherapie) wirksamer ist als Psychotherapie alleine erfordert weitere Studien
- Behandlungserfolg scheint unabhängig vom Therapiesetting (ambulant, tagesklinisch, stationär) -> primär ambulante Therapie
- Limitationen der Meta-Analyse
 - Studienqualität häufig eingeschränkt
 - Nachhaltigkeit für angeleitete Selbsthilfe unklar: keine FU-Untersuchungen

Svaldi et al. 2019

Zusammenfassung

Bulimia nervosa

- Patientinnen mit Bulimia nervosa sollten primär ambulant behandelt werden
- Behandlung der ersten Wahl ist eine Psychotherapie
 - die meiste Evidenz liegt für KVT vor (Remission ca. 38%)
 - angeleitete Selbsthilfe basierend auf KVT (Remission ca. 25%)
- Pharmakotherapie soll nicht als alleinige Therapie angeboten werden
 - Fluoxetin 60mg in D zugelassen (Wirkung bevorzugt auf Essanfälle)
- Aussagen zur Wirksamkeit sind nur für die KVT möglich.

Svaldi et al. 2019

Psychotherapie

BINGE EATING STÖRUNG

Binge Eating Störung: Meta-Analyse

Vergleich Prä-Post-Treatment

Kognitive Verhaltenstherapie

- Abstinenzrate Essanfälle: 53% (CI 0,45 – 0,61), Gewicht: n.s.
- Drop out: 19%

Pharmakotherapie

- Abstinenzrate Essanfälle: 45% (CI 0,40 – 0,50), Gewicht: - 2,3kg
- Drop out: 29%

Angeleitete Selbsthilfe

- Abstinenzrate Essanfälle: 46% (0,33 – 0,59), Gewicht: n.s.
- Drop out: 24%

Kombinationstherapie

- Kein zusätzlicher Nutzen

Konservative Gewichtsreduktion

- Abstinenzrate Essanfälle: 45% (CI 0,30-0,53), Gewicht: -3,2-7,2kg
- Drop out: hoch

Hilbert et al. 2019, 2020

Binge Eating Störung: Meta-Analyse

- Abstinenzrate für Essanfälle in Gruppentherapie höher als in Einzeltherapie (kein sign. Unterschied für Zahl der Essanfälle)
- Je höher die Zahl der Essanfälle vor Therapiebeginn desto stärker die Reduktion der Zahl der Essanfälle (kein sign. Zshg. für Abstinenzrate)
- Drop-out Rate Psychotherapie ca. 19%, Selbsthilfe 24%
- KVT war anderen Psychotherapien hinsichtlich der Abstinenzrate nicht überlegen
- Nachhaltigkeit für Psychotherapie und Selbsthilfe

Zusammenfassung

Binge-Eating Störung

- Behandlung der ersten Wahl sollte Psychotherapie sein:
 - meiste Evidenz für KVT (12 Mo-FU: Abstinenz 49%, Gewicht -4kg)
 - angeleitete Selbsthilfe (12 Mo-FU: Abstinenz 49%, Gewicht 0kg)
 - Konserv. Gewichtsreduktion (12 Mo-FU: Abstinenz ≈38%, Gewicht -5kg)
- Psychotherapie entfaltet sign. Effekt auf das Gewicht erst nach Therapieende bzw. im Verlauf (Enttäuschungsprophylaxe!)
- Derzeit kein Medikament in D zugelassen (USA: FDA Zulassung für Lisdexamfetamin)
 - Lisdexamfetamin, AD der 2. Generation, Antikonvulsiva sollten erwogen werden, wenn PT abgelehnt wird bzw. nicht erfolgreich ist
 - Keine Nachhaltigkeit!

Zusammenfassung

Essstörungen

- Essstörungen sind häufig „dran denken“
- Körperliche Aspekte berücksichtigen (Hohe Morbidität und Mortalität)
- Remissionsrate nach Psychotherapie 40-50%
- Früher Behandlungsbeginn ist prognostisch bedeutsam
- Körperlich stabile Patientinnen mit einem BMI > 15kg/m² sollten primär ambulant behandelt werden
- Anorexia nervosa: Intensive Nachsorge nach stationärer Behandlung beachten, Rückfallrate ca. 31%

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERSAMKEIT